

PLANCHE A. — COUPE GÉNÉRALE DU FLANC EXTERNE DE BELLEDONNE ET DU BORD SUBALPIN

Echelle : 1/80.000, tant pour les hauteurs que pour les longueurs.

Q. Alluvions quaternaires.
Gl. Moraines.
Mol. Mollasse miocène.
C8. Maëstrichtien.
Cs. Grès du Gault supérieur et du Cénomanien.
g. Lumachelle du Gault.
Ur. Urgonien (Barrèmien et Aptien inférieur).
H. Hauterivien.
V. Valanginien.
Js. Jurassique supérieur. (Lusitanien, Kimeridgien, Tithonique.)
C. Ox. Bathonien, Callovien et Oxfordien.
Jm. Bajocien.
Aa. Aalénien.
L. Lias, type de Laffrey, à entroques.
Ld. Lias, type dauphinois.
Tg. Trias avec gypse (μ = spilites.)
T. Trias sans gypse
h. Houiller.
X. Massifs hercyniens (y compris pour le rameau externe lambeaux de la couverture triasico-liasique, en place).
φ1 φ2. Surfaces de traînage.
F, F. Failles ou plis-failles.

Erratum de la légende gravée. — Faisceau du Serre, *lire* « Marge du *Rameau* principal » (et non du *faisceau* principal).

Nota : La partie droite de la coupe (Grand-Serre, Ollière) est schématisée, soit comme topographie, soit comme tectonique.

Au voisinage de la surface de traînage (φ_2), le Rameau hercynien principal est en réalité affecté de replis et sa couverture secondaire est plus ou moins décollée, tandis qu'à l'Est elle repose normalement sur les terrains anciens.