

DIAGNOSE. — Tours plus élevés et plus comprimés que dans l'espèce-type; les côtes secondaires sont plus fines et plus nombreuses, les tubercules marginaux très espacés.

DIMENSIONS. — 52 mm, 26 mm (0,50), 16 mm (0,30), 11 mm (0,21).

DESCRIPTION. — Les tours très embrassants se recouvrent sur plus des trois quarts de leur hauteur. La section est ovale et haute. Les flancs convexes montrent leur maximum d'épaisseur vers les deux tiers de leur hauteur. Le contour ventral est anguleux et porte une rangée médiane de tubercules siphonaux aigus. La paroi ombilicale est faible et verticale. Au diamètre de 52 mm, les flancs sont ornés de 13 côtes primaires proverses et chacune donne naissance à 4 ou 5 côtes secondaires fines rursi-radiées mais à concavité antérieure nette. Le nombre des tubercules marginaux est sensiblement égal à celui des côtes primaires.




Fig. 1. — *Fontannesiella valentina rarinoda* n. subsp.,  $\times 1/2$ .

a) Schéma de l'ornementation.  
b) Section.



Fig. 2. — *Fontannesiella valentina rarinoda* n. subsp.,  $\times 1$ .

AFFINITÉS. — Il s'agit manifestement d'une forme très voisine de *Fontannesiella valentina* (Fontannes) décrite à Crussol dans le même niveau, c'est-à-dire dans les calcaires du Château (z. à *Glochiceras lithographicum*). Elle en diffère cependant nettement par sa spire plus aplatie, son plus grand nombre de côtes secondaires et ses tubercules marginaux très espacés.




Fig. 3. — *Fontannesiella valentina* (Fontannes)  $\times 1/2$ .

a) Schéma de l'ornementation.  
b) Section.