




Fig. 91. — Rouleaux quartzo-feldspathiques allongés parallèlement aux axes des plis 2 (micaschistes de l'Ordovicien inférieur du flanc Nord de l'anticlinal de Sanabria, Sierra Segundera)

quent la direction des plis 2 et son plongement dépend évidemment du pendage et de la direction

de la schistosité primaire avant la phase 2. Cependant, comme les deux phases sont la plupart du temps homoaxiales, la linéation de crénulation est elle aussi très souvent horizontale.

2° Les linéations d'intersection :

On a pour la phase 2 plusieurs linéations d'intersection :

- une linéation qui résulte de l'intersection des schistosités primaire et secondaire, et qui est évidemment parallèle à la linéation de micro-plissement ;
- une linéation qui résulte de l'intersection de la stratification avec la schistosité secondaire et dont le plongement dépend du pendage de la direction de la stratification avant la phase 2.

3° Les rouleaux :

Les rouleaux sont très fréquents au cours de la phase 2, notamment dans les parties les plus métamorphiques (fig. 91). Ils se développent principalement aux dépens du quartz d'exsudation sym-métamorphique qui est remplissé par la deuxième phase. Ces rouleaux sont parallèles aux axes des plis 2.




Fig. 92. — Système de plis conjugués à symétrie monoclinique (même localisation que fig. 93).



Fig. 93. — Pli 2 de type chevron dans le Précambrien autochtone métamorphique du pli couché de Mondoñedo (région de Foz) (partie gauche de la fig. 92).