




Fig. 99. — Système de kink-bands conjugués à symétrie monoclinique replissant la schistosité primaire (flanc Nord-Est de l'anticlinal couché de Sarria). Précambrien épimétamorphique.



Fig. 100. — Kink-bands résultant d'une compression subhorizontale replissant la schistosité primaire (Silurien du flanc Sud de la Sierra de Caurel).

II. — LES PLIS TARDIFS DE GALICE ORIENTALE.

Ces plis se développent dans une zone étroite (quelques centaines de mètres à quelques kilomètres) et longue (140 km) sur le bord interne du dôme de Villalba-Sarria. Ils affectent de préférence les schistes tendres du Silurien près du contact avec leur substratum compétent de mica-schistes cambriens et précambriens plus ou moins injectés de granites. Depuis la côte Nord-galicienne (Vivero) jusqu'au Sud-Ouest de Sarria, ce contact est jalonné par une importante faille normale dont

le pendage est voisin de la foliation (50 à 70° vers l'Ouest et le Sud-Ouest) (fig. 101).

Ces plis d'échelle centimétrique à métrique sont à plan axial subhorizontal et déversés vers l'Ouest et le Sud-Ouest et replissent la schistosité primaire qui plonge fortement (50 à 80°) vers l'Ouest ou le Sud-Ouest.

Ils ont une allure en chevron ou en genou, souvent de type kink-band. Ils sont parfois très serrés (région de Guntin), mais rarement isoclinaux. Ils montrent souvent des axes courbes




Fig. 101. — Allure des plis tardifs sur le flanc occidental de l'anticlinal couché de Mondoñedo-Lugo-Sarria.