

M. GIGNOUX et L. MORET, *Géologie dauphinoise*, 1952, p. 204) attribuait l'interruption de la falaise cristalline de la Madeleine et la présence de Trias à la source de Faunafrey au passage du « synclinal médian » de Belledonne. En fait, il n'y a pas de pincement synclinal à Faunafrey puisque les affleurements qui semblaient imposer cette interprétation sont simplement glissés : on sait d'ailleurs (R. MICHEL et P. BERTHET, 1958, *C. R. Acad. Sc.*, p. 1888-1890) que l'accident médian de Belledonne passe plus à l'E, dans le vallon du Bruyant.

2. Autres glissements dans la région de Séchilienne-Vizille.

Mont-Sec.

Le plateau de Mont-Sec est limité au S par une falaise concave, verticale, d'une trentaine de mètres de haut et dominant un replat assez vaste (fig. 3). Il s'agit à l'évidence de la crevasse supérieure, en cours d'ouverture, d'une niche d'arrachement très spectaculaire qui correspond au départ récent d'une zone tassée. Dans la pente,



Fig. 3. — Détail de la fig. 2 :
Vue rapprochée du sommet du tassement de Mont-Sec.

en contrebas, s'observent de nombreux ressauts de terrain étagés à peu près parallèlement à cette crevasse supérieure : leur existence montre que la zone glissée tend à se débiter en une série de paquets encore jointifs. Ces crevasses sont en gros parallèles aux directions de foliations qui ont dû, par conséquent, favoriser le déclenchement du processus de tassement.

Montfalcon.

Face aux Thiébauds, en rive gauche de la Romanche, les versants de l'arête de Montfalcon

montrent des figures nettes de tassements avec niches d'arrachement dans les falaises supérieures et lobes convexes à la base des zones glissées. Il est probable que le glissement du versant est a affecté les micaschistes jusqu'au talweg du Grand Rif, face à Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, et aurait recouvert en partie le Houiller de l'accident médian de Belledonne en ce point.

Vizille.

Entre le Péage-de-Vizille et Vizille, le rebord ouest du cristallin de Belledonne vient « baver »