



FIG. 2. – Coupe d'El Mangraner (Province de Castellón, Espagne). B : vue de la Formation des Calcaires de Herbers (Valanginien). C : vue de détail de B, horizon de marne lacustre beige ayant livré la population-type du *Globator fallax* n. sp. (le marteau mesurant 31,5 cm donne l'échelle).

FIG. 2. – *El Mangraner section (Castellón Province, Spain)*. B : view of the Herbers Limestones Formation (Valanginian). C : detailed view of B. layer of the brown lacustrine marls which has yielded the type-population of the *Globator fallax* n. sp. (scale indicated by hammer 31,5 cm length).

intéressant inventaire micropaléontologique [échantillons MAN 1 à 7 ; références pour la nomenclature taxonomique dans Oertli *et al.*, 1985 ; Blanc, 1996 ; Blanc et Mojon, 1996] :

- Echantillon MAN 1 :

Charophytes : *Globator nurrensis steinhauseri*,

*Nodosoclavator* sp., *Porochara maxima*, *Porochara jaccardi*. Ostracodes : *Fabanella boloniensis*, *Macrodentina* (*Dictyocythere*) gr. *mediostricta*, *Cypridea* sp. Gastéropodes : *Hydrobia* sp., autres spp. indéf. Foraminifères benthiques : petits Lituolidés (*Feurtillia* ? sp.). Dasycladacées : *Zergabriella embergeri*, Clypéines.